هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

I. تقديم الدالة $f(x)=\exp(x)=e^x$ (الأسية النبرية):

تقديم الدالة الأسية النبري :

1. نشاط : لنعتبر الدالة العددية المعرفة ب: $f :]0,+\infty[\to \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x)=\ell n(x)$$

- هل f تقابل من المجال $I=]0,+\infty[$ إلى مجال J ؟ علل جوابك مع تحديد J.

2. مفردات:

الدالة العكسية f^{-1} ل f تسمى الدالة الأسية النبرية (أو الدالة الأسية) ويرمز لها ب: exp أو e .

ولهذا نكتب: $f^{-1}=\exp=e: \mathbb{R} \to]0,+\infty[$

$$x \mapsto f^{-1}(x)=\exp(x)=e^x$$

3. تعريف و خاصية:

الدالة العددية المعرفة ب : $f(x)=\ell n(x)$ متصلة و تزايدية قطعا على المجال $]0,+\infty[$ و منه الدالة $f(x)=\ell n(x)$ تقابل من $]0,+\infty[$ إلى $\mathbb{R}$. الدالة العكسية f^{-1} ل f تسمى الدالة الأسية النبرية (أو الدالة الأسية) و يرمز لها ب: exp أو e .

الدالة الأسية معرفة كما يلي : $f^{-1}=\exp=e: \mathbb{R} \to]0,+\infty[$

$$x \mapsto f^{-1}(x)=\exp(x)=e^x$$

4. ملحوظة :

- العلاقة التي تربط $f(x)=\ell n(x)$ و $f^{-1}(x)=\exp(x)=e^x$ هي : $\left.\begin{matrix}\exp(x)=e^x=y\\ x\in\mathbb{R}\end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x=\ell n(y)\\ y>0\end{matrix}\right.$
- لدينا: $\forall x\in]0,+\infty[: f^{-1}\circ f(x)=x \Leftrightarrow f^{-1}(f(x))=x$ إذن : $\forall x\in]0,+\infty[, \exp\circ \ell n(x)=x \Leftrightarrow \exp(\ell n(x))=x$
- لدينا: $\forall x\in\mathbb{R} : f\circ f^{-1}(x)=x \Leftrightarrow f(f^{-1}(x))=x$ إذن : $\forall x\in\mathbb{R} , \ell n\circ \exp(x)=x \Leftrightarrow \ell n(\exp(x))=x$.

5. كتابة جديدة :

- نعلم أن : $\forall r\in\mathbb{Q} , r=\ell n(e^r)$ (1) إذن : $(1) \Leftrightarrow \forall r\in\mathbb{Q} , \exp(r)=\exp(\ell n(e^r)) \Leftrightarrow \forall r\in\mathbb{Q} , \exp(r)=e^r$

ومنه نحصل على : $\forall r\in\mathbb{Q} : \exp(r)=e^r$

وهذا يدفعنا لتمديد هذه الكتابة على باقي الأعداد الحقيقية x ومنه : نكتب $\forall x\in\mathbb{R} : \exp(x)=e^x$

6. نتائج:

	الدالة $f(x)=\exp(x)=e^x$		
1	معرفة على $D_f=\mathbb{R}$	5	$\forall x>0 : e^{\ell n(x)}=x$
2	متصلة على $D_f=\mathbb{R}$ و قابلة للاشتقاق على $D_f=\mathbb{R}$	6	$\forall x\in\mathbb{R} : \ell n(e^x)=x$
3	تزايدية قطعا على المجال $D_f=\mathbb{R}$.	7	$\forall a,b\in\mathbb{R} : a=b \Leftrightarrow e^a=e^b$
4	$\left.\begin{matrix}y=e^x\\ x\in\mathbb{R}\end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x=\ell n(y)\\ y>0\end{matrix}\right.$	8	$\forall a,b\in\mathbb{R} : a<b \Leftrightarrow e^a<e^b$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

7. أمثلة :

1. $e^x-3=0\Leftrightarrow e^x=3\Leftrightarrow x=\ell n(3)$

2. $e^{\ell n(24)}=24$ و $\ell n\left(e^{-13}\right)=-13$ و $e^x-3=0\Leftrightarrow e^x=3\Leftrightarrow x=\ell n(3)$.

3. $e^{x+3}=e^{2x+7}\Leftrightarrow x+3=2x+7$ و $e^{x+1}<e^{6x-2}\Leftrightarrow x+1=6x-2$

8. إشارة e^x :

x	$-\infty$	$+\infty$
e^x	+	

$\forall x\in\mathbb{R}: e^x>0$ (إشارة e^x موجبة قطعا)

9. تطبيق:

1) حدد مجموعة تعريف: $f(x)=\frac{2}{e^x}$ و $f(x)=\sqrt{e^x}$

2) حل المعادلة: $e^{2x}-e^{(x-1)}=0$

3) حل المتراجحة: $e^{2x}-e^{(x-1)}\le 0$

II. خاصيات $f(x)=\exp(x)=e^x$

خاصيات جبرية :

1. خاصيات :

	لكل a و b من $\mathbb{R}$	مثال		لكل x من $\mathbb{R}$ و r من $\mathbb{Q}$	مثال
1	$e^{a+b}=e^a\times e^b$	$e^7=e^4\times e^3$	4	$\left(e^x\right)^r=e^{rx}\ (r\in\mathbb{Q})$	$\left(e^x\right)^3=e^{3x}$
2	$e^{-b}=\frac{1}{e^b}$	$e^{-2}=\frac{1}{e^2}$	5	$\sqrt{e^x}=e^{\frac{1}{2}x}$	$\sqrt{e^{x-3}}=e^{\frac{1}{2}(x-3)}$
3	$e^{a-b}=\frac{e^a}{e^b}$	$e^5=\frac{e^7}{e^2}$	6	$\sqrt[3]{e^x}=e^{\frac{1}{3}x}$	$\sqrt[3]{e^{2+2x}}=e^{\frac{1}{3}(2+2x)}$

2. برهان : ل : $e^{a+b}=e^a\times e^b$

ليكن a و b من $\mathbb{R}$ نضع : $A=e^{a+b}$ و $B=e^a\times e^b$.

ومنه :

$$A=e^{a+b}\Leftrightarrow \ell n(A)=\ell n\left(e^{a+b}\right)$$
$$\Leftrightarrow \ell n(A)=a+b \quad , \quad (1)$$
$$B=e^a\times e^b\Leftrightarrow \ell n(B)=\ell n\left(e^a\times e^b\right)$$
$$\Leftrightarrow \ell n(B)=\ell n\left(e^a\right)+\ell n\left(e^b\right)$$
$$\Leftrightarrow \ell n(B)=a+b \quad , (2)$$

حسب (1) و (2) نحصل على $\ell n(A)=\ell n(B)$ إذن : $A=B$ أي $e^{a+b}=e^a\times e^b$.

خلاصة : $e^{a+b}=e^a\times e^b$

3. ملحوظة:

الكتابة : $e^x\times e^x=\left(e^x\right)^2=e^{2x}$ و $e^x\times e^x\times e^x=\left(e^x\right)^3=e^{3x}$.

بصفة عامة : $\underbrace{e^x\times e^x\times\cdots\times e^x}_{n}=\left(e^x\right)^n=e^{nx}$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

III. مشتقة الدالة الأسية:

1. خاصية:

الدالة : $f(x)=e^x$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و لدينا : $\forall x\in\mathbb{R}:(e^x)'=e^x$.

بمأن الدالة $f(x)=\ell n(x)$ قابلة للاشتقاق على $I=]0,+\infty[$. و دالتها المشتقة $f'(x)=\frac{1}{x}$ لا تنعدم على هذا المجال فإن دالتها العكسية f^{-1} قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$.

لدينا : $\forall x\in\mathbb{R}:\ (e^x)'=(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'\circ f^{-1}(x)}=\frac{1}{f'(e^x)}=\frac{1}{\frac{1}{e^x}}=e^x$.

خلاصة : $\forall x\in\mathbb{R}:(e^x)'=e^x$

2. خاصية:

$u(x)$ دالة قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة $f(x)=e^{u(x)}$ قابلة للاشتقاق على I و دالتها المشتقة تحقق ما يلي:

$$f'(x)=\left[e^{u(x)}\right]'=u'(x)e^{u(x)}$$

- تطبيق: أحسب الدالة المشتقة ل: $f(x)=e^{5x^3+3x}$

جواب : $f'(x)=\left[e^{5x^3+3x}\right]'=(5x^3+3x)'\times e^{5x^3+3x}=(15x^2+3)e^{5x^3+3x}$

3. ملحوظة:

الدوال الأصلية للدالة ل : $g(x)=u'(x)e^{u(x)}$ هي الدوال التي على شكل: $(c\in\mathbb{R})$; $G(x)=e^{u(x)}+c$

4. تطبيق:

نجد الدوال الأصلية ل: $f(x)=x.e^{3x^2+1}$ هي $F(x)=\frac{1}{6}e^{3x^2+1}+c$

IV. نهايات اعتيادية ل $f(x)=e^x$

1. نهايات اعتيادية

نهايات $f(x)=e^x$	تأويل الهندسي لنتيجة
$\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0^+$	الدالة f تقبل مقارب أفقي معادلته: $y=0$ (اي محور الأفاصيل) بجوار $-\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$	ومنه يجب دراسة الفرع اللانهائي بجوار $+\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}=+\infty$	الدالة f تقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتيب بجوار $+\infty$.

نهايات يجب معرفتها

1	$\lim\limits_{x\to-\infty}x\times e^x=0^-$
2	$\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$
3	$\lim\limits_{x\to-\infty}x^n\times e^x=0$ مع $(n\in\mathbb{N}^*)$
4	$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$ مع $n\in\mathbb{N}^*$

2. برهان :

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

أ – لنهاية اعتيادية : مثلا : $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty$. (يمكن استنتج هذه النهاية من خلال $f(x)=\ell n(x)$ و دالتها العكسية $f^{-1}(x)=e^x$)

نضع : $e^x=X$ إذن : $x\to+\infty$ فإن : $X\to+\infty$ و كذلك $x=\ell n(X)$.

ومنه : $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=\lim\limits_{X\to+\infty} \ell n(X)=+\infty$.

خلاصة : $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty$.

ب – لنهاية يجب معرفتها : مثلا : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n}=+\infty$ مع $n\in\mathbb{N}^*$.

نضع : $X=\frac{x}{n}$ إذن : $x\to+\infty$ فإن : $X\to+\infty$.

ومنه : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n}=\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{nX}}{(nX)^n}=\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{(e^X)^n}{(nX)^n}=\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{e^X}{nX}\right)^n=\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{n^n}\left(\frac{e^X}{X}\right)^n=+\infty$

3. تطبيق1 :

تطبيق 1 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x}$

طريقة1 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x\times e^x}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x}\times e^x=+\infty$

طريقة2 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{2x}=\lim\limits_{t\to+\infty} \frac{e^t}{t}=+\infty$ مع $t=2x$


تطبيق2 : أحسب : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x+2x}{x^3}$

V. دراسة الدالة $f(x)=e^x$:

جدول تغيرات f :

x	$-\infty$		$+\infty$
f '		+	
f		↗	$+\infty$
	0		

إنشاء منحنى الدالة f في م. م. م $(0,\vec{i},\vec{j})$



للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

VI. الدالة الأسية للأساس a مع: $a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$:

1. تعريفّ:

ليكن a من $]0,1[\cup]1,+\infty[$. الدالة المعرفة كما يلي: $\forall x>0 \ , \ \log_a(x)=\dfrac{\ell n(x)}{\ell n(a)}$ هي متصلة و رتيبة قطعا على $]0,+\infty[$ هي تقابل و تقابلها العكسي f^{-1} يسمى الدالة الاسية للأساس a و معرفة كما يلي :

$$f^{-1} \ : \ \mathbb{R} \to]0,+\infty[$$
$$x \to f^{-1}(x)=e^{x\ell n a}$$

2. توضيح :

$$f^{-1}(x)=y \Leftrightarrow f(y)=x$$
$$\Leftrightarrow \log_a(y)=x$$
$$\Leftrightarrow \frac{\ell n(y)}{\ell n(a)}=x$$
$$\Leftrightarrow \ell n(y)=x\ell n(a)$$
$$\Leftrightarrow y=e^{x\ell n(a)}$$

إذن : $f^{-1}(x)=y \Leftrightarrow e^{x\ell n(a)}=y$.

3. كتابة جديدة ل $f^{-1}(x)=e^{x\ell n a}$:

نأخذ : r من $\mathbb{Q}$ نحصل على $f^{-1}(r)=e^{r\ell n a}=e^{\ell n a^r}=a^r$.

وهذا يدفعنا لتمديد هذه الكتابة على باقي الأعداد الحقيقية x ومنه : نكتب $\forall x \in \mathbb{R} \ , \ f^{-1}(x)=e^{x\ell n a}=a^x$

خلاصة : $\forall x \in \mathbb{R} \ , \ e^{x\ell n a}=a^x$.

4. مثال :

$5^x=e^{x\ell n 5}$ و $\left(\frac{1}{5}\right)^x=e^{-x\ell n 5}$ و $10^x=e^{x\ell n 10}$.

5. ملحوظة : لكل x من $\mathbb{R}$: $\log_a(a^x)=x$. و لكل $x>0$: $a^{\log_a(x)}=x$ و $10^x=y \Leftrightarrow x=\mathrm{Log}(y)$

6. تذكير لمراحل تعريف الأس :

- القوة ذات الأس الصحيح الطبيعي : $\forall n \in \mathbb{N}^* \ a^n=\underbrace{a\times a\times .....\times a}_{n}$ مع $a^1=a$ و $a^0=1$.
- القوة ذات الأس الصحيح النسبي : $\forall p>0 \ , a^p=\underbrace{a\times a\times .....\times a}_{p}$ و $(a\neq 0) \ , \ \forall p<0 \ , a^p=\dfrac{1}{a^{-p}}$ مع $a^1=a$ و $a^0=1$

.

- القوة ذات الأس الجذري : $r=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q}$ (مع $p\in\mathbb{Z}$ و $q\in\mathbb{N}^*$) $(a>0) \ , \ \forall r \in \mathbb{Q} \ , a^r=a^{\frac{p}{q}}=\sqrt[q]{a^p}$.
- القوة ذات الأس عدد حقيقي $(a>0) \ , \ \forall x \in \mathbb{R} \ , a^x=e^{x\ell n a}$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

7. نتائج:

ليكن a من $]0,1[\cup]1,+\infty[$ و الدالة $f(x)=a^x=e^{x\ell na}$

1) f معرفة و متصلة و قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$.

2) $[f(x)]'=\left(a^x\right)'=\left(\ell n(a)\right)\times e^{x\ell na}=\left(\ell n(a)\right)\times a^x$

3) ومنه إشارة: $[f(x)]'=\left(a^x\right)=\left(\ell n(a)\right)\times a^x$ هي إشارة ℓna :

- إذا كان: $0<a<1$ فإن: $f(x)=a^x=e^{x\ell na}$ تناقصية : ومنه : $\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2: a^x<a^y\Leftrightarrow x>y$.
- إذا كان : $a>1$ فإن : $f(x)=a^x=e^{x\ell na}$ تزايدية : ومنه : $\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2: a^x<a^y\Leftrightarrow x<y$

8. خاصيات :


لكل x و y من $\mathbb{R}$:

- $a^x=a^y\Leftrightarrow x=y$
- $a^x\times a^y=a^{x+y}$ و $\frac{1}{a^x}=a^{-x}$ و $\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$ و $\left(a^x\right)^y=a^{xxy}$

إنشاء منحنى الدالة: f في معلم متعامد ممنظم $\left(0,\vec{i},\vec{j}\right)$ مع

حالة 1 : $0<a<1$ نأخذ: $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$

حالة 2 : $a>1$ نأخذ : $f(x)=2^x$.



9. مثال :

1) أكتب الدالة الآتية باستعمال الدالة الأسية النبرية : $f(x)=3^{x^3-x}$

2) حدد مجموعة تعريف f.

3) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

4) ثم أحسب الدالة المشتقة f ' ل f.

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma